

LES CHLAENIUS DE LA COLLECTION DU MUSÉUM DE BUDAPEST.

Par: Ing. Jedlička Arnošt (Praha).

Le muséum de Budapest m'a confié la détermination des *Chlaenius* et j'ai trouvé dans cet matériel quelques nouvelles espèces, que j'ai dédié aux entomologistes hongrois. Les types de la plupart des espèces se trouvent au muséum Budapest.

Chlaenius Kaszabi sp. n.

Très remarquable par sa forme allongée et les élytres oblong-ovales et par la couleur extraordinaire, laquelle on ne trouve pas chez aucun *Chlaenius*, que je connais.

Le dessus chez un exemple d'un pourpré-violet, chez le second les élytres sont plus rouge-cuivreux-violet et la tête et pronotum sont plus cuivreux. Les pattes noires, les antennes brun-obscur, les trois premiers articles plus foncés. Labrum droit. Par la forme de la taille il se rapproche de *Homalolachnus vertagoides*, mais sans la ponctuation ocellée des élytres et par les autres caractères il appartient à un autre groupe. La tête comme chez *Hom. vertagoides* et de même ponctuée. Pronotum un peu plus large que la tête et un peu plus large que long, un peu échancré devant, presque droit à la base, également rétréci en avant et en arrière, mais arrondi en avant, presque rectiligne en arrière; les angles postérieurs obtus, modérément arrondis au sommet extrême. Les fossettes basales sont ovales, peu profondes, toute la surface ponctuée densément et assez grossièrement, mais un peu plus faible que chez *vertagoides*. La rigole latérale étroite et peu relevée.

Elytres oblong-ovales, de la même forme que chez *vertagoides*, avec les épaules très arrondis, un peu élargis après le milieu et arrondis au sommet, avec une faible sinuation devant l'apex. Les stries profondes, les interstries convexes, densément et assez fortement ponctués (4—5 lignes par largeur), et faiblement pubescents. La saillie prosternale rebordée, les proépisternes éparsément ponctués, les metépisternes avec un sillon externe et un peu plus longs que larges. Abdomen lisse. Deux femelles. Long. 13 mm, large 5 mm. Encienne Afr. or., sans indication précise. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

Par la forme du corps il se rapproche au *Chl. Heyrovskýi* Jedl. de Joko à Cameroun et il diffère de celui-ci par la couleur (celui-ci est noir avec une tache jaune au milieu), par le pronotum un peu plus étroit, plus densément et moins grossièrement ponctué. Les élytres sont striés et ponctués de même. J'ai placé *Chl. Heyrovskýi* (chez le mâle du type manquent les dernières articles des palpes) provisoirement dans le subg. *Stenodinodes* et *Chl. Kaszabi* appartient au le même groupe.

***Chlaenius conformis* var. *jokoanus* var. n.**

Diffère de la forme typique par la forme de la macule antéapicale, qui est très réduite et se compose de quatre taches situées sur les intervalles 4—7, dont les deux externes sont un peu prolongées vers l'apex.

Cameroun, 2 ex. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

***Chlaenius flaviguttatus* ab. *immaculipennis* ab. n.**

Diffère du type par l'absence de la tache jaune sur l'apex des élytres. Nouvelle Guinée (type) 8 ex, Nord Queensland 1 ex. Type dans ma collection, cotype au muséum Budapest.

***Chlaenius Székessyi* sp. n.**

Tête d'un vert luisant avec un faible reflet bleuâtre, pronotum vert métallique avec les bords latéraux bleus, au milieu parfois cuivreux. Elytres noirs mats avec le bord extrême violet. Les deux premiers articles des antennes, les palpés et pattes rouges, le rest des antennes presque noirs et parfois les tibias postérieurs rembrunis. Tête finement ponctué dans la partie postérieure. Pronotum carré, plus au moins aussi large que long, rétréci modérément en avant, pas ou très peu en arrière, avec la plus grande largeur au milieu; le bord antérieur échancré avec les angles antérieurs peu avancés, les angles postérieurs

presque droits, arrondis au bout, la base coupée obliquement vers les angles postérieurs. Les côtés relevés, surtout derrière. La surface ponctuée modérément, la ponctuation plus épars en avant, très dense devant la base et autour des impressions basales, qui sont assez faibles. Les élytres allongés, peu arrondis aux côtés, finement striés, les intervalles un peu convexes, densément ponctués et pubescents. Les metepisternes aussi larges que longs et peu ponctués. Long 11—13 mm. Cameroun: Joko, 12 ex. Type dans ma collection, 5 cotypes au muséum Budapest.

Probablement voisin au *Chl. amydrus* All., lequel je ne connais pas, mais qui est plus grand, autrement coloré et avec les pattes noirs.

Chlaenius Horváthi sp. n.

D'un noir peu luisant, les bouts des palpes rouges. Labrum droit. Tête finement pointillée, entremêlé par quelques points plus grands. Pronotum carré, un peu plus large que long, plus large que la tête, distinctement échaneré en avant avec les angles antérieurs saillants et arrondis, les côtés arrondis et rétrécis assez fortement en avant, presque rectiligne en arrière, la base plus large qu'en avant, aussi large qu'au milieu du pronotum, droite au milieu, mais coupée obliquement vers les angles postérieurs, qui sont obtus et peu arrondis au sommet. Les impressions basales sont linéiformes, courtes, toute la surface du pronotum est couvert d'une ponctuation très serrée, surtout le long de la base. Elytres sont larges, à la base aussi large que la base du pronotum, la plus grande largeur se trouve au milieu, les côtés sont légèrement arrondis. Les stries sont profondes, faiblement ponctuées, les intervalles modérément convexes, finement et densément ponctués et pubescents. L'angle humeral obtus. Saillie prosternale non rebordée, le metepisterne aussi long que large, tout le dessous ponctué. Long. 15 mm, large 6.5 mm. Uganda: Mujenje, 4 femelles. Type au muséum Budapest, cotype dans ma collection.

Par son facies il ressemble au *Chl. carbonatus* Chd., mais appartient au groupe du *Chl. piceus* et voisin au *Chl. sculptilis* Bat., qui d'après la description est plus grande (18 mm), et a „thorace elongato versus apicem parum angustato” et „sulcis fundo crenato-punctatis”. Par ces deux caractères il diffère du *Chl. Horváthi*.

Chlaenius Pongráczy sp. n.

Tête et pronotum noir-bleu brillants, avec un reflet violet le long des côtés et dans les impressions basales, les élytres bleus-noirs mats, avec une tache rouge dans le dernier quart sur les intervalles 6—8, mal délimitée, composée de trois petites taches, dont la tache sur le 6 intervalle est plus longue. Le dessous noir, les antennes, les palpes et pattes rouge-jaunes. Labrum non échancré, la tête sans ponctuation. Pronotum cordiforme, presque aussi large que la tête, un peu plus long que large, le bord antérieur faiblement échancré, les angles antérieurs peu saillants, les côtés arrondis, faiblement sinués devant les angles postérieurs, qui sont un peu obtus, la base un peu plus courte que le bord antérieur, les impressions basales profondes, le rigol latéral relevé, surtout dans les impressions basales, ponctué un peu le long de la ligne médiane et autour de la base. Elytres oblong-ovales, avec les épiales arrondies, les stries assez profondes, modérément ponctuées, les interstries presque plans et aussi modérément ponctués (3 lignes par largeur). Prosternum rebordé, imponctué, les metepisternes plus longues que larges, éparsément ponctués, l'abdomen presque lisse. Les cuisses antérieures du mâle avec une petite dent aigüe. Long. 13 mm, large 5 mm. Nouvelle Guinée, 1 mâle, 1 femelle. Type dans la collection du muséum Budapest, cotype dans ma collection.

Appartient au groupe du *punctatostriatus* Chd. et *Semperi* Chd. de la tabelle du Chaudoir, mais très voisin au *Chl. occultus* Sloine de N. Guinée, que je ne connais pas, mais d'après la description *Chl. Pongráczy* diffère du *occultus* par la couleur, par la présence d'une tache rouge devant l'apex des élytres, par l'abdomen lisse et par présence d'une dent sur les cuisses du mâle.

Chlaenius (Callistoides) Csikii sp. n.

Tête bleue, luisant, pronotum et les élytres noirs mats, les pattes, palpes et antennes jaune-rouges, le troisième article noirci. Une petite macule devant l'apex, mal délimitée est composé de deux taches sur les intervalles 1—2, dont la première se prolonge un peu vers l'apex; ou cette tache manque complètement ab. *astrolabensis* ab. n. — Très voisine du *Chl. guttula* Chd., dont il diffère par le pronotum plus large, par les angles antérieurs plus saillants, par les angles postérieurs moins obtus, par les élytres plus larges et plus courts, également striés,

mais moins densément ponctués. La ponctuation de la tête et du pronotum la même, les antennes sont autrement colorées. La tache antéapicale est plus petite. Long. 7.5 mm. Nouvelle Guinée: Stephansort (Astrolabe Bai). Les types au muséum Budapest, cotypes dans ma collection.

Chlaenius — виды в Будапештском Музее.

Автор: Инженер Иедличка Арношт (Прага)

РЕЗЮМЕ

Среди *Chlaenius* коллекции, присланной автору для определения, он нашел, неизвестные до сих пор в науке, 5 новые виды и 2 разновидности, которым он придал имена венгерских этнологов. Подробно описанные виды и разновидности суть: *Chlaenius Kaszabi* n. sp., *C. conformis* var. *jokoanus* n. var., *C. Székessyi* n. sp. из Африки, а также *C. flaviguttatus* ab. *immaculipennis* n. ab., *C. Horváthi* n. sp., *G. Pongrácz* n. sp., *C. Csiki* n. sp. из Новой Гвинеи. Типы заново описанных видов и разновидностей являются собственностью Будапештского Музея.